



# 27º CIOSP

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo  
24 a 28 de janeiro de 2009 - Anhembi - SP

TIPO DE ATIVIDADE: **FÓRUM CIENTÍFICO**

ÁREA: **Implantodontia**

APRESENTADOR / AUTOR: **ALEXANDRE DE MELO**

CO-AUTOR1: **BRUNO KÖNIG JÚNIOR**

CO-AUTOR2: **RENATO PAULO CHOPARD**

TEMA DO TRABALHO: **ESTUDO DA REPARAÇÃO DO ALVÉOLO DENTAL PREENCHIDO COM OSSO AUTÓGENO PARTICULADO APÓS EXODONTIA**

## RESUMO:

O OBJETIVO DESTA TRABALHO FOI INVESTIGAR A INFLUÊNCIA DO ENXERTO ÓSSEO AUTÓGENO PARTICULADO NO PROCESSO DE REPARO ÓSSEO DO ALVÉOLO DENTAL APÓS EXODONTIA. FORAM UTILIZADOS 67 RATTUS NOVERGICUS, LINHAGEM WISTAR DIVIDIDOS EM UM GRUPO CONTROLE E OUTRO EXPERIMENTAL. OS RATOS CONTROLES FORAM SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA EXODONTIA DO INCISIVO SUPERIOR DIREITO APENAS, ENQUANTO NOS RATOS EXPERIMENTAIS FORAM REALIZADAS A EXODONTIA E ENXERTIA ÓSSEA NO ALVÉOLO DENTAL. O ENXERTO ÓSSEO FOI PROVENIENTE DO OSSO ILÍACO DOS PRÓPRIOS ANIMAIS. A EUTANÁSIA DOS ANIMAIS FOI REALIZADA NO 5, 15, 21 E 28 DIAS DE PÓS-OPERATÓRIO E AS PARTES ÓSSEAS QUE CONTÉM O ALVÉOLO DENTAL FORAM PROCESSADAS PARA ANÁLISE HISTOLÓGICA EM MICROSCOPIA DE LUZ CONVENCIONAL E FLUORESCENTE. A DENSIDADE DE ÁREA OCUPADA POR OSSO FOI QUANTIFICADA POR UM MÉTODO DE CONTAGEM DIFERENCIAL DE PONTOS E COM AUXÍLIO DE UM PROGRAMA DE IMAGENS. OS RESULTADOS MOSTRARAM QUE HOVE AUMENTO PROGRESSIVO DA DENSIDADE DE ÁREA OCUPADA POR OSSO EM FUNÇÃO DOS TEMPOS PÓS-OPERATÓRIOS E QUE OS GRUPOS CONTROLE E EXPERIMENTAL NÃO APRESENTARAM DIFERENÇAS ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS NA QUANTIDADE DE OSSO NO ALVÉOLO DENTAL. CONCLUIU-SE QUE O ENXERTO ÓSSEO AUTÓGENO NÃO PROMOVEU UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DA NEOFORMAÇÃO ÓSSEA NO ALVÉOLO DENTAL APÓS EXODONTIA.



# 27º CIOSP

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo  
24 a 28 de janeiro de 2009 - Anhembi - SP

TIPO DE ATIVIDADE: **FÓRUM CIENTÍFICO**

ÁREA: **Odontopediatria**

APRESENTADOR / AUTOR: **AMANDA MARTINS DE LIMA**

CO-AUTOR1: **MÔNICA MIYUKI MASUYAMA**

CO-AUTOR2: **MARCELO PAES DE BARROS**

CO-AUTOR3: **MARIANA FERREIRA LEITE**

TEMA DO TRABALHO: **EFEITO DE FORMULAÇÕES FLUORETADAS SOBRE A ATIVIDADE DA PEROXIDASE SALIVAR HUMANA.**

## RESUMO:

A PEROXIDASE SALIVAR É UMA ENZIMA ANTIOXIDANTE COM AÇÃO ANTIMICROBIANA SOBRE AGENTES CARIOGÊNICOS. O OBJETIVO DO ESTUDO FOI AVALIAR A ATIVIDADE DA PEROXIDASE APÓS O USO DAS FORMULAÇÕES FLUORETADAS UTILIZADAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. O PROTOCOLO DO ESTUDO FOI APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL. FOI COLETADA A SALIVA TOTAL ESTIMULADA COM PARAFILM® ANTES E APÓS A APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR-GEL NEUTRO EM 17 CRIANÇAS (6 A 10 ANOS). ALÍQUOTAS DA SALIVA COLETADA ANTES DA APLICAÇÃO DO FLÚOR-GEL FORAM INCUBADAS COM ÁGUA DESTILADA, NAF 0.05% OU NAF 0.2% POR 5 MINUTOS A 37 °C. OS PARÂMETROS ANALISADOS FORAM O FLUXO SALIVAR E A ATIVIDADE DA PEROXIDASE. AS MÉDIAS FORAM COMPARADAS PELO TESTE T DE STUDENT, CONSIDERANDO UM NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA DE 5%. OS RESULTADOS MOSTRARAM QUE O FLÚOR-GEL ESTIMULA O FLUXO SALIVAR (55%), PORÉM CAUSA UMA REDUÇÃO SIGNIFICANTE (30%) NA ATIVIDADE DA PEROXIDASE (P<0.05). EM CONTRAPARTIDA, AS SOLUÇÕES DE NAF 0.05% E 0.2% CAUSARAM UM AUMENTO (76 E 48%, RESPECTIVAMENTE) DA ATIVIDADE DA PEROXIDASE (P<0.05). OS RESULTADOS SUGEREM QUE O TIPO DE FORMULAÇÃO FLUORETADA PODE INFLUENCIAR EM PARÂMETROS SALIVARES, POTENCIALIZANDO OU INIBINDO A AÇÃO DE AGENTES FISIOLÓGICOS ENVOLVIDOS NO MECANISMO DE DEFESA CONTRA CÁRIE DENTÁRIA.



# 27º CIOSP

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo  
24 a 28 de janeiro de 2009 - Anhembi - SP

TIPO DE ATIVIDADE: **FÓRUM CIENTÍFICO**  
ÁREA: **DENTÍSTICA RESTAURADORA**

APRESENTADOR / AUTOR: **ANDREA DIAS NEVES LAGO**

CO-AUTOR1: **PATRÍCIA MOREIRA DE FREITAS**  
CO-AUTOR2: **NARCISO GARONE NETTO**

TEMA DO TRABALHO: **AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE UMA RESINA COMPOSTA AO ESMALTE CLAREADO E SUBMETIDO AO CONDICIONAMENTO COM LASER DE ER:YAG.**

## RESUMO:

ESTE TRABALHO AVALIOU A RESISTÊNCIA ADESIVA DA RESINA COMPOSTA AO ESMALTE BOVINO CLAREADO COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 35% E SUBMETIDO AO CONDICIONAMENTO COM O LASER DE ER:YAG. FORAM UTILIZADOS 30 DENTES BOVINOS DIVIDIDOS, ALEATORIAMENTE, EM 6 GRUPOS (N=5): G1: SEM CLAREAMENTO + CONDICIONAMENTO COM ÁCIDO FOSFÓRICO (AC) A 35% (CONTROLE); G2: SEM CLAREAMENTO + CONDICIONAMENTO COM LASER DE ER:YAG + AC 35%; G3: CLAREAMENTO + AC 35% (RESTAURADOS IMEDIATAMENTE APÓS O CLAREAMENTO); G4: CLAREAMENTO + AC 35% (RESTAURADOS 24 HORAS APÓS O CLAREAMENTO); G5: CLAREAMENTO + CONDICIONAMENTO COM LASER DE ER:YAG + AC 35% (RESTAURADOS IMEDIATAMENTE APÓS O CLAREAMENTO); G6: CLAREAMENTO + CONDICIONAMENTO COM LASER DE ER:YAG + AC 35% (RESTAURADOS 24 HORAS APÓS O CLAREAMENTO). A RESISTÊNCIA ADESIVA FOI AVALIADA ATRAVÉS DO ENSAIO DE MICROTRAÇÃO (1,0MM/MIN) E OS DADOS SUBMETIDOS À ANÁLISE ESTATÍSTICA ATRAVÉS DOS TESTES DE ANOVA E TUKEY ( $\alpha=0.05$ ). OS VALORES ENCONTRADOS EM MPA FORAM: G1-26.17±4.44, G2-28.87±3.94, G3-17.25±4.58, G4-21.93±5.02, G5-16.69±2.31, G6-29.06±8.31. PODE-SE CONCLUIR QUE O CONDICIONAMENTO COM LASER DE ER:YAG DE SUPERFÍCIES CLAREADAS FAVORECE PROCEDIMENTOS ADESIVOS QUANDO REALIZADOS 24 HORAS APÓS O CLAREAMENTO.



# 27º CIOSP

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo  
24 a 28 de janeiro de 2009 - Anhembi - SP

TIPO DE ATIVIDADE: **FÓRUM CIENTÍFICO**

ÁREA: **Patologia Bucal**

APRESENTADOR / AUTOR: **CAIO CESAR FLORIANO LUZ**

CO-AUTOR1: **LEANDRO BORGES DE ARAÚJO**

CO-AUTOR2: **JOSÉ ANTONIO DIAS GARCIA**

CO-AUTOR3: **EVELISE ALINE SOARES**

TEMA DO TRABALHO: **O EFEITO DA DISLIPIDEMIA NA MORFOLOGIA ÓSSEA DA MANDÍBULA DE CAMUNDONGOS LDLR-/-.**

## **RESUMO:**

OS ALTOS NÍVEIS DO COLESTEROL CAUSAM MODIFICAÇÕES NO TECIDO ÓSSEO, TAIS COMO A PROLIFERAÇÃO INTENSA DE OSTEOCLASTOS E A INIBIÇÃO DA ATIVIDADE OSTEOBLASTICAS. O AUMENTO DOS LIPÍDEOS CIRCULANTES LIMITA A ATIVIDADE OSTEOBLASTICA E DIMINUI DE FORMA ACENTUADA A REMODELAGEM ÓSSEA.O OBJETIVO DO TRABALHO FOI AVALIAR O EFEITO DA DISLIPIDEMIA NA MORFOLOGIA ÓSSEA DA MANDÍBULA DE CAMUNDONGOS KNOCKOUT PARA O GENE DO RECEPTOR DE LDL (LDLR-/-) E C57BL6 ( WILD TYPE).OS EXPERIMENTOS FORAM REALIZADOS EM CAMUNDONGOS SELVAGENS ( WILD TYPE) (CEPA C57BL6) E EM CAMUNDONGOS HOMOZIGOTOS PARA A AUSÊNCIA DO GENE DO RECEPTOR LDL (LDLR-/-. OS ANIMAIS FORAM OBTIDOS DA JACKSON LABORATORIES (EUA) E CRIADOS NO BIOTÉRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIFENAS COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 12 NO CICLO CLARO/ESCURO.OS COMUNDONGOS FORAM DIVIDIDOS EM 6 GRUPOS: 2 GRUPOS DE CAMUNDONGOS SELVAGEM QUE RECEBERAM DIETA NORMAL, 2 GRUPOS DE CAMUNDONGOS LDLR-/ - QUE RECEBERAM DIETA NORMAL E 2 GRUPOS LDLR-/ - QUE RECEBERAM DIETA HIPERLIPÍDICA, UM GRUPO TRATADO DURANTE 15 DIAS E O OUTRO 100 DIAS RESPECTIVAMENTE.OS RESULTADOS OBSERVADOS PODEMOS RESSALTAR QUE OS RATOS LDLR-/ - APRESENTARAM MAIOR REABSORÇÃO ÓSSEA DECORRENTE DA INTENSA AÇÃO OSTEOCLÁSTICA QUANDO COMPARADO COM OS RATOS NORMOLIPÍDICOS.COM A ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA PODEMOS OBSERVAR EROÇÃO ÓSSEA DAS CORTICAIS.



# 27º CIOSP

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo  
24 a 28 de janeiro de 2009 - Anhembi - SP

TIPO DE ATIVIDADE: **FÓRUM CIENTÍFICO**

ÁREA: **Estomatologia**

APRESENTADOR / AUTOR: **CLAUDIO JAMERSON DE SOUZA GONÇALVES**

CO-AUTOR1: **INGRID MORGANA DA SILVA FERNANDES**

CO-AUTOR2: **FABIANA BARROS MARINHO**

CO-AUTOR3: **MARIA SUELI MARQUES SOARES**

TEMA DO TRABALHO: **ESTUDO DA CORRELAÇÃO ENTRE GLICOSE SALIVAR E ÍNDICE CPI EM DIABÉTICOS TIPO I**

## RESUMO:

O PRESENTE ESTUDO TEVE OBJETIVO DE DETERMINAR A TAXA DE GLICOSE SALIVAR EM PACIENTES DIABÉTICOS E RELACIONÁ-LA COM A DOENÇA PERIODONTAL. FORAM SELECIONADOS 69 INDIVÍDUOS, SENDO 36 DIABÉTICOS TIPO I E 33 NÃO-DIABÉTICOS COLETOU-SE FLUXO SALIVAR EM REPOUSO E FOI REALIZADO O EXAME BUCAL COM O ÍNDICE CPI RECOMENDADO PELA OMS. DETERMINOU-SE A GLICOSE SALIVAR POR MÉTODO ENZIMÁTICO, SENDO A SALIVA CENTRIFUGADA, MISTURADA AO REAGENTE E LEVADA A BANHO MARIA. REALIZOU-SE LEITURA DA GLICOSE SALIVAR EM ESPECTROFOTÔMETRO. ANÁLISE FOI DESCRITIVA SENDO APLICADO O COEFICIENTE DE PEARSON E TESTE MANN-WHITNEY, CONSIDERANDO SIGNIFICANTES  $P < 0,05$ . PARA REALIZAR O CPI, UTILIZOU-SE DA SONDA WHO SENDO A ARCADA DENTÁRIA DIVIDIDA EM SEIS SEXTANTES. NO GRUPO DIABÉTICOS 52% ERAM HOMENS E 48% MULHERES, MÉDIA DA IDADE  $15 \pm 7,1$  ANOS. NO CONTROLE 42% ERAM HOMENS E 58% MULHERES, MÉDIA DE IDADE  $14,4 \pm 6,5$  ANOS. NOS DIABÉTICOS A MÉDIA DE GLICOSE SALIVAR FOI  $17,6 \pm 16,2$  MG/DL E NO CONTROLE  $5,5 \pm 4,9$  MG/DL, SEM DIFERENÇA SIGNIFICANTE ( $P = 0,002$ ). A DOENÇA PERIODONTAL NÃO FOI OBSERVADA TÃO SEVERAMENTE NA POPULAÇÃO ESTUDADA, JÁ QUE SE TRATAVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIABÉTICOS TIPO I. PORTANTO, CONCLUI-SE QUE A TAXA DE GLICOSE SALIVAR NÃO TEM CORRELAÇÃO SIGNIFICATIVA COM O ÍNDICE DE CPI COM  $P = 0,823$  PARA O GRUPO DOS DIABÉTICOS.



# 27º CIOSP

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo

24 a 28 de janeiro de 2009 - Anhembi - SP

TIPO DE ATIVIDADE: **FÓRUM CIENTÍFICO**

ÁREA: **Saúde Coletiva**

APRESENTADOR / AUTOR: **DANIEL DEMÉTRIO FAUSTINO DA SILVA**

TEMA DO TRABALHO: **AVALIAÇÃO DE 2 ANOS DO TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART) REALIZADO EM UMA COMUNIDADE BRASILEIRA EXCLUÍDA**

## RESUMO:

O PRESENTE TRABALHO TEVE COMO OBJETIVO AVALIAR APÓS 2 ANOS O PROGRAMA INSTITUÍDO POR TRÊS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ESF DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, MINAS GERAIS, BRASIL. MATERIAIS E MÉTODOS - FOI REALIZADO UM LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE 11.108 CRIANÇAS ENCONTRANDO: RESULTADOS QUE SERVIRAM COMO BASE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO PSF, ONDE INTRODUZIU O A.R.T. PELA SUA EFICÁCIA E RESOLUTIVIDADE NO CONTROLE DE DOENÇAS BUCAIS E NA RECUPERAÇÃO DAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIAS; DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO NA PREPARAÇÃO DE UM FIO DENTAL ALTERNATIVO FEITO DE RÁFIA DESFIADA E ESTERILIZADA, PRIORIZANDO O ATENDIMENTO DE GRUPOS TERAPÊUTICOS, VISTO TEREM SUA SAÚDE FRAGILIZADA, COMO OS HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, GESTANTES E OS BEBÊS. POPULAÇÕES ATINGIDAS EXTREMAMENTE CARENTES, MUITAS DESTAS, VIVENDO E SOBREVIVENDO DO LIXO. RESULTADOS - DEMONSTRARAM NITIDAMENTE UMA INTEGRAÇÃO COM TODA A ESF, UMA VEZ QUE TODOS ESTAVAM VOLTADOS PARA DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SISTÊMICAS E BUCAIS. REALIZOU-SE: 11.742 CONSULTAS, 3.237 VISITAS DOMICILIARES, 2.182 PALESTRAS COM BASES EDUCATIVAS / PREVENTIVAS, 10.317 ESCOVAÇÕES SUPERVISIONADAS, 5.694 APLICAÇÕES TÓPICAS DE FLÚOR E 2.253 - ART. OS ÍNDICES DAS DOENÇAS BUCAIS FORAM SIGNIFICATIVAMENTE MELHORADOS E OBTIVERAM-SE 86,9% E 98,0% DE RETENÇÃO DE 969 RESTAURAÇÕES AVALIADAS EMBENTES DECÍDUOS E PERMANENTE RESPECTIVAMENTE RESULTADOS ESTES ESTATISTICAMENTE SIGNIFICANTES (TESTE QUI-QUADRADO  $P < 0,0001$ ). CONCLUSÃO - FOI CERTEIRO E MUITO IMPORTANTE TER OPTADO POR UTILIZAR O ART PRECONIZADO PELA OMS NA ESF - PSF, REAFIRMANDO A CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DESTES PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS APÓS TEREM SIDO CAPACITADOS PARA TAL, E TAMBÉM, A ESCOLHA DO MATERIAL RESTAURADOR (VITROMOLAR-DFL) QUE PRESENTOU UM EXCELENTE COMPORTAMENTO CLÍNICO MUDANÇAS DE PARADIGMA SOBRE SAÚDE, ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE DOENÇAS FORAM FATOS.



# 27º CIOSP

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo  
24 a 28 de janeiro de 2009 - Anhembi - SP

TIPO DE ATIVIDADE: **FÓRUM CIENTÍFICO**

ÁREA: **Odontopediatria**

APRESENTADOR / AUTOR: **ERNESTO NASCIMENTO FILHO**

CO-AUTOR1: **TANIA O. SCHACH**

CO-AUTOR2: **MARCIA PINTO ALVES MAYER**

TEMA DO TRABALHO: **ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS E CLÍNICOS DA CAVIDADE ORAL EM CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFEITOS CONGÊNITOS DE NEUTRÓFILOS**

## RESUMO:

A PROPOSIÇÃO DESTE TRABALHO FOI DETERMINAR NÍVEIS SALIVARES DE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS (EGM), OCORRÊNCIA DE LESÕES ORAIS, INFLAMAÇÃO GENGIVAL, PRESERVAÇÃO DO TECIDO ÓSSEO PERIODONTAL, PREVALÊNCIA DE BACTÉRIAS PERIODONTOPATOGÊNICAS: AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS E PORPHYROMONAS GINGIVALIS EM PACIENTES COM DOENÇAS RARAS POR MAU FUNCIONAMENTO DE FAGÓCITOS. ONZE CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS COM IDADE ENTRE DOIS E TREZE ANOS, SENDO QUE DUAS APRESENTAM SÍNDROME DE KOSTMANN (SK), SEIS DE NEUTROPENIA CÍCLICA (NC), UMA NEUTROPENIA POR GLICOGENOSE (NG-TIPO1B), UMA SÍNDROME DE GRISCELLI (SG) E OUTRA DOENÇA GRANULOMATOSA CRÔNICA (DGC). AMOSTRAS DE SALIVA ESTIMULADAS FORAM COLETADAS PARA DETECTAR NÍVEIS DE EGM. BIOFILME SUBGENGIVAL FOI COLETADO PARA DETERMINAR A PRESENÇA DE A. ACTINOMYCETEMCOMITANS E P. GINGIVALIS POR PCR. FORAM AVALIADOS OS ÍNDICES DE PLACA, GENGIVAL E EXAME RADIOGRÁFICO. EGM FORAM DETECTADOS EM QUATRO CRIANÇAS (36%) DA AMOSTRA, E ESTES NÃO EXCEDERAM A 106 UFC/ML. A. ACTINOMYCETEMCOMITANS FOI DETECTADA EM OITO DAS ONZE CRIANÇAS (72,7%), E P. GINGIVALIS NÃO DETECTADA (0,0%). FOI DETERMINADA GRANDE VARIABILIDADE DO ÍNDICE DE SANGRAMENTO GENGIVAL ENTRE OS PACIENTES. A AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA MOSTROU PERDA ÓSSEA LEVE E SEVERA EM CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE SK. DE ACORDO COM OS RESULTADOS, RECOMENDAMOS ACOMPANHAMENTO PELO CIRURGIÃO-DENTISTA E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EFETIVAS NESTA POPULAÇÃO ESTUDADA. APOIO FINANCEIRO FADA - FUNDO DE AUXÍLIO AOS DOCENTES E ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-UNIFESP.



# 27º CIOSP

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo  
24 a 28 de janeiro de 2009 - Anhembi - SP

TIPO DE ATIVIDADE: FÓRUM CIENTÍFICO

ÁREA: ENDODONTIA

APRESENTADOR / AUTOR: IVENS FRISCHKNECHT

CO-AUTOR1: IRDIVAL C. FIGUEIRÊDO JÚNIOR

CO-AUTOR2: MANOEL DAMIÃO SOUSA NETO

CO-AUTOR3: YARA T. CORREA SILVA SOUSA

CO-AUTOR4: DANYEL ELIAS DA CRUZ PEREZ

TEMA DO TRABALHO: AVALIAÇÃO DA BIOCAMPATIBILIDADE DE CIMENTOS ENDODÔNTICOS EM TECIDOS SUBCUTÂNEOS DE RATOS.

## RESUMO:

O OBJETIVO DESTA TRABALHO FOI AVALIAR, EM TECIDOS SUBCUTÂNEOS DE RATOS, A BIOCAMPATIBILIDADE DE QUATRO CIMENTOS ENDODÔNTICOS. FORAM UTILIZADOS QUINZE RATOS, MACHOS, COM PESO MÉDIO DE 250 GRAMAS. ESTABELECEU-SE 4 GRUPOS EXPERIMENTAIS DE ACORDO COM CIMENTO AVALIADO: I- EPIPHANY, II- AH PLUS, III - SEALER26 E IV- ENDOFILL. OS CIMENTOS FORAM ACONDICIONADOS EM TUBOS DE POLIETILENO ESTERILIZADOS E IMPLANTADOS EM 4 DIFERENTES REGIÕES DO DORSO DOS ANIMAIS, REPRESENTANDO CADA TUBO UM GRUPO EXPERIMENTAL. APÓS 7, 21 E 42 DIAS, 5 ANIMAIS FORAM MORTOS, OBTENDO 5 AMOSTRAS DE CADA GRUPO EM CADA UM DOS PERÍODOS ESTUDADOS. APÓS 7 DIAS, NOS GRUPOS II, III E IV HAVIA INFLAMAÇÃO CRÔNICA DE INTENSIDADE LEVE A MODERADA, COM PRESENÇA DE ALGUNS FOCOS DE NECROSE NO GRUPO IV. NO GRUPO I, OBSERVOU-SE INFLAMAÇÃO DE INTENSIDADE MODERADA A INTENSA ASSOCIADA A ÁREAS DE NECROSE. APÓS 21 DIAS A INTENSIDADE DA INFLAMAÇÃO DIMINUIU, SENDO LEVE NOS GRUPOS I, II, III E LEVE A MODERADA NO GRUPO IV, SEM EVIDÊNCIAS DE NECROSE. APÓS 42 DIAS, TODOS OS GRUPOS APRESENTAVAM APENAS LINFÓCITOS OCASIONAIS E FIBROSE. EM TODOS OS GRUPOS OBSERVOU-SE CIMENTO RESIDUAL E AUSÊNCIA DE CÉLULAS GIGANTES DE CORPO ESTRANHO. CONCLUI-SE QUE OS CIMENTOS ESTUDADOS APRESENTARAM PROPRIEDADE BIOLÓGICA SATISFATÓRIA.





# 27º CIOSP

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo  
24 a 28 de janeiro de 2009 - Anhembi - SP

TIPO DE ATIVIDADE: **FÓRUM CIENTÍFICO**

ÁREA: **Saúde Coletiva**

APRESENTADOR / AUTOR: **NAIARA DE PAULA FERREIRA**

CO-AUTOR1: **LÍDIA MORAES RIBEIRO JORDÃO**

CO-AUTOR2: **CLÁUDIO RODRIGUES LELES**

CO-AUTOR3: **MARIA DO CARMO MATIAS FREIRE**

TEMA DO TRABALHO: **PERCEPÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA E PERSPECTIVA PROFISSIONAL DE ESTUDANTES: TENDÊNCIAS NO DECORRER DOS ANOS E DO CURSO**

## RESUMO:

O DELINEAMENTO DO PERFIL ACADÊMICO E DAS PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS DOS ESTUDANTES CONSTITUI-SE IMPORTANTE SUBSÍDIO PARA A AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA INSTITUIÇÃO. O OBJETIVO DESTA ESTUDO É INVESTIGAR A FINALIDADE DA ODONTOLOGIA E A PERSPECTIVA PROFISSIONAL DE ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA NUM PERÍODO DE 16 ANOS E AO LONGO DO CURSO. A AMOSTRA FOI COMPOSTA DE 339 ESTUDANTES RECÉM INGRESSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS NO PERÍODO 1992-2008, QUE RESPONDERAM A UM QUESTIONÁRIO. PARA COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS FORAM UTILIZADOS OS TESTES ESTATÍSTICOS QUI-QUADRADO E KAPPA. QUANTO À FINALIDADE DA ODONTOLOGIA PREVALECEU PREVENÇÃO / PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL E GERAL E REDUZIU ASSISTÊNCIA CURATIVA E ESTÉTICA. NO DECORRER DOS ANOS E AO LONGO DO CURSO, A QUANTIDADE DE ALUNOS QUE PRETENDIA TRABALHAR EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO E NO SERVIÇO PÚBLICO AUMENTOU. AO LONGO DOS ANOS, AUMENTOU TAMBÉM A INTENÇÃO DE ATENDER POPULAÇÃO DE ALTA E DE BAIXA RENDA E AO LONGO DO CURSO, A MAIORIA PERMANECEU INDECISA. A MAIORIA DESEJAVA SE ESPECIALIZAR, MAS ESSA INTENÇÃO DIMINUI AO FINAL DO CURSO. A PREFERÊNCIA POR ORTODONTIA DIMINUIU, ENQUANTO QUE POR IMPLANTODONTIA E ESTÉTICA AUMENTARAM. CONCLUI-SE QUE HOUVE MUDANÇAS NA PERCEPÇÃO SOBRE A ODONTOLOGIA E NA PERSPECTIVA PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES NO PERÍODO ANALISADO E AO LONGO DO CURSO.