

**FORUM CIENTÍFICO**

**FCI-002 - OCLUSÃO / PRÓTESE**

Data: 28/01/2012 Horário: das 12h30 às 12h55

APRESENTADOR / AUTOR: **ANDREA BARREIRA MOTTA**

CO-AUTOR1: **LUIZ CARLOS PEREIRA**

CO-AUTOR2: **FERNANDO PEREIRA DUDA**

TEMA DO TRABALHO: **ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO EM FADIGA DE DENTES RESTAURADOS COM COROAS TOTAIS METALOCERÂMICAS**

**RESUMO:**

AS RESTAURAÇÕES DEVEM SER CAPAZES DE RESISTIR ÀS MESMAS CONDIÇÕES ORAIS IMPOSTAS AOS DENTES NATURAIS, OU SEJA, FORÇAS CÍCLICAS DE BAIXA INTENSIDADE DURANTE A MASTIGAÇÃO E EM MEIO CORROSIVO. O OBJETIVO DESTA TRABALHO FOI VERIFICAR O COMPORTAMENTO MECÂNICO DO SISTEMA DENTE/RESTAURAÇÃO EM FADIGA. OS ENSAIOS DE FADIGA FORAM REALIZADOS EM DENTES PRÉ-MOLARES RESTAURADOS COM COROAS TOTAIS METALOCERÂMICAS, COM CARGA DE 100 E 350 N APLICADA NAS DUAS CÚSPIDES SIMULTANEAMENTE COM FREQUÊNCIA DE 1HZ, MANTIDOS EM MEIO ÚMIDO. AS AMOSTRAS SUBMETIDAS A 100 N NÃO FRATURARAM MESMO QUANDO SUBMETIDAS A DEZ MILHÕES DE CICLOS. FOI ENCONTRADO DESPRENDIMENTOS DE MATERIAL NA PORÇÃO EXTERNA DA CERÂMICA E ALTERAÇÃO DE COLORAÇÃO. FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR REGIÕES COM TRINCAS NA FACE OCLUSAL, PRÓXIMA AO SULCO PRINCIPAL QUE PODERIAM CAUSAR FRATURA. NA REGIÃO RADICULAR OCORREU O APARECIMENTO OU O AUMENTO DE TRINCAS, PRINCIPALMENTE NAS FACES PROXIMAS. PODE-SE CONCLUIR QUE O SISTEMA METALOCERÂMICO APRESENTA UMA LONGEVIDADE ALTA, PODENDO ULTRAPASSAR OS 10 ANOS DE USO. É POSSÍVEL AFIRMAR QUE SOB FADIGA, NA PRESENÇA DE UMIDADE, HÁ A FORMAÇÃO DE TRINCAS NOS DENTES DO SISTEMA ANALISADO E QUE ESTAS CRESCEM COM O TEMPO DE CICLAGEM DE CARGA, PODENDO OCORRER A PENETRAÇÃO DE BACTÉRIAS CAUSADORAS DE CÁRIES, DOENÇAS ENDODÔNTICAS E PERIODONTAIS.

**FORUM CIENTÍFICO**

**FCI-003 - SAÚDE COLETIVA**

Data: 28/01/2012 Horário: das 13h às 13h25

APRESENTADOR / AUTOR: **DANIELLE TUPINAMBA EMMI**

CO-AUTOR1: REGINA FÁTIMA FEIO BARROSO  
CO-AUTOR2: ANA DANIELA SILVA DA SILVEIRA  
CO-AUTOR3: ETIANE PRESTES BATIROLA

TEMA DO TRABALHO: **O USO DO PORTFÓLIO COMO INSTRUMENTO CRÍTICO DE PERCEPÇÃO DO ALUNO DE ODONTOLOGIA NA SUA EXPERIÊNCIA NO SUS.**

RESUMO:

A FORMAÇÃO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES EXIGIDO PARA A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, NECESSITA FORMAR PROFISSIONAIS COM PERFIL CRÍTICO, EM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR, ONDE PROBLEMATIZAR POSSA SIGNIFICAR MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS EM SUA FORMAÇÃO E NAS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE. UTILIZAR O PORTFÓLIO COMO NOVA PROPOSTA METODOLÓGICA DE REGISTRO SEMANAL DAS APRENDIZAGENS OBTIDAS DAS EXPERIÊNCIAS MAIS SIGNIFICATIVAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), É O OBJETIVO DESTES TRABALHOS. FORAM ANALISADOS 10 PORTFÓLIOS ATRAVÉS DE UMA ABORDAGEM QUALITATIVA SOBRE A PERCEPÇÃO DO SUS PELOS ALUNOS, SEUS QUESTIONAMENTOS, E SUAS PROPOSTAS PARA OS PROBLEMAS VIVENCIADOS. CADA DISCENTE TEVE A LIVRE INICIATIVA PARA APRESENTAR SEUS REGISTROS SEMANAIS NA LINGUAGEM QUE MELHOR SE IDENTIFICOU, OU SEJA, CADA PORTFÓLIO CONSTRUÍDO FOI UMA CRIAÇÃO ÚNICA E COM LINGUAGENS DISTINTAS. O USO DO PORTFÓLIO DEMONSTROU UM RESULTADO EFICAZ PARA INCENTIVAR A CONSTRUÇÃO DE IDÉIAS E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS REFLEXIVAS, CRÍTICAS E CRIATIVAS, RESULTADO DO SEU APRENDIZADO E DA SUA VIVÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

**FORUM CIENTÍFICO**

**FCI-005 - ORTODONTIA**

Data: 28/01/2012 Horário: das 14h às 14h25

APRESENTADOR / AUTOR: **ERIKA MACHADO CALDEIRA**

CO-AUTOR1: **AMANDA OSÓRIO AYRES DE FREITAS**

CO-AUTOR2: **DANIELA SALES ALVIANO**

CO-AUTOR3: **DELMO SANTIAGO VAITSMAN**

CO-AUTOR4: **MATILDE DA CUNHA GONÇALVES NOJIMA**

TEMA DO TRABALHO: **ASPECTO ANTIMICROBIANO E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR DE MATERIAIS PARA COLAGEM ORTODÔNTICA**

**RESUMO:**

MUITOS INVESTIMENTOS TÊM SIDO DISPENSADOS À PESQUISA DE MATERIAIS PARA COLAGEM ORTODÔNTICA, SENDO A INCORPORAÇÃO DE FLÚOR UMA IMPORTANTE ALTERNATIVA NO INTUITO DE DIMINUIR O RISCO POTENCIAL DE DESMINERALIZAÇÃO DENTÁRIA. O OBJETIVO DO ESTUDO FOI AVALIAR A CAPACIDADE ANTIMICROBIANA E A LIBERAÇÃO DE FLÚOR DE 3 MATERIAIS DE COLAGEM: TRANSBONDTM XT, TRANSBONDTM PLUS COLOR CHANGE E FUJI ORTHOTM LC. FORAM CONFECCIONADOS 39 ESPÉCIMES DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DOS FABRICANTES, MANTENDO LISURA DE SUPERFÍCIE E DIMENSÕES PADRONIZADAS. A CAPACIDADE ANTIMICROBIANA DOS MATERIAIS INCLUÍDOS NO ESTUDO PARA S.MUTANS, L.CASEI E C.ALBICANS FOI AVALIADA DETERMINANDO-SE A PORCENTAGEM DE INIBIÇÃO DE CRESCIMENTO DESTES MICRO-ORGANISMOS EM MEIO INOCULADO, OBTIDA ATRAVÉS DAS LEITURAS DAS DENSIDADES ÓPTICAS POR ESPECTROFOTÔMETRO. O POTENCIAL DE INTERFERIR NO CRESCIMENTO MICROBIANO SOBRE A SUPERFÍCIE DOS MATERIAIS ESTUDADOS FOI OBSERVADO POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA. A LIBERAÇÃO DE FLUORETO EM ÁGUA ULTRA-PURA DURANTE 14 DIAS FOI ANALISADA ATRAVÉS DA CROMATOGRAFIA DE ÍONS. O GRUPO PLUS APRESENTOU O MAIOR PERCENTUAL DE INIBIÇÃO MICROBIANA, ASSIM COMO A SUPERFÍCIE MAIS LIVRE DE CONTAMINAÇÃO. O GRUPO FUJI APRESENTOU A MELHOR CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR. PODE-SE CONCLUIR QUE O TRANSBONDTM PLUS COLOR CHANGE FOI O MATERIAL QUE APRESENTOU MELHOR COMPORTAMENTO GERAL DIANTE DOS ASPECTOS AVALIADOS.

**FORUM CIENTÍFICO**

**FCI-006 - ENDODONTIA**

Data: 28/01/2012 Horário: das 14h30 às 14h55

APRESENTADOR / AUTOR: **KARLINNE MARIA MARTINS DUARTE**

CO-AUTOR1: ANTONIO LUIZ AMARAL PEREIRA

CO-AUTOR2: SORAIA DE FÁTIMA CARVALHO SOUZA

CO-AUTOR3: JULIANA BALBINOT HILGERT

CO-AUTOR4: FERNANDO NEVES HUGO

TEMA DO TRABALHO: **EFETIVIDADE DAS MEDICAÇÕES INTRACANAL PARA TRATAMENTO DE NECROSE PULPAR: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE**

**RESUMO:**

MUITAS MEDICAÇÕES INTRACANAL VEM SENDO UTILIZADAS PARA O TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE POLPAS NECROSADAS. NO ENTANTO AINDA NÃO FOI ESTABELECIDO QUAL MEDICAÇÃO INTRACANAL É A MAIS EFETIVA PARA OS TRATAMENTOS DE NECROSE PULPAR. O OBJETIVO DESTA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE FOI COMPARAR A EFETIVIDADE DE MEDICAÇÕES INTRACANAL PARA TRATAMENTO DE DENTES COM POLPA NECROSADA NA REDUÇÃO DA DOR E PREVENÇÃO DE FLARE-UP, REPARAÇÃO DE TECIDOS PERIAPICAIS, E ELIMINAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA MICROBIOTA ENDODÔNTICA. A BUSCA FOI REALIZADA NOS BANCOS DE DADOS LILACS, MEDLINE E COCHRANE LIBRARY. NA METANÁLISE FOI UTILIZADO ODDS RATIO, COM INTERVALO DE CONFIANÇA DE 95%. FORAM ENCONTRADOS 582 ARTIGOS, 552 FORAM EXCLUÍDOS APÓS A LEITURA DOS TÍTULOS E RESUMOS E 30 FORAM LIDOS NA ÍNTEGRA. FORAM SELECIONADOS 3 ARTIGOS COM BAIXO A MODERADO RISCO DE VIÉS, SENDO QUE DOIS PUDERAM SER AGRUPADOS E AVALIADOS PARA O DESFECHO DOR, SOMANDO 252 PACIENTES. O ALTO RISCO DE VIÉS ENCONTRADO NOS ESTUDOS E A FALTA DE SEMELHANÇA ENTRE AS INTERVENÇÕES, NÃO PERMITIU QUE OS DADOS FOSSEM AGRUPADOS. DESTA FORMA, APENAS OS CORTICÓIDES PARA O DESFECHO DOR PÓS-OPERATÓRIA FORAM ANALISADOS. NÃO HÁ EVIDÊNCIAS QUE O USO DE CORTICOSTERÓIDES DIMINUA A FREQUÊNCIA DE DOR PÓS-OPERATÓRIA 24 HORAS APÓS A INTERVENÇÃO.

**FORUM CIENTÍFICO**

**FCI-009 - ODONTOGERIATRIA**

Data: 28/01/2012 Horário: das 16h às 16h25

APRESENTADOR / AUTOR: **MIRTES HELENA MANGUEIRA DA SILVA DIAS**

CO-AUTOR1: **SUZANA CARIELO DA FONSECA**

TEMA DO TRABALHO: **TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALZHEIMER ATRAVÉS DO "TRABALHO RELACIONAL"**

RESUMO:

PORTADORES DE DEMÊNCIA DO TIPO ALZHEIMER (DA), APRESENTAM ESPECIFICIDADES QUE DEVEM SER LEVADAS EM CONTA, QUANDO DA NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. O OBJETIVO DESTA PESQUISA FOI AVALIAR DE QUE MODO SERIA POSSÍVEL, NOS VÁRIOS ESTÁGIOS DA DOENÇA, CONSEGUIR UMA COMUNICAÇÃO QUE GERASSE A COOPERAÇÃO DO PACIENTE NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, BEM COMO O ENVOLVIMENTO DO FAMILIAR/CUIDADOR. PARTICIPARAM 51 PACIENTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM DOENÇA DE ALZHEIMER, OS QUAIS FORAM INSERIDOS EM TRÊS PLANOS DE TRATAMENTO, LEVANDO EM CONTA OS VÁRIOS ESTÁGIOS DA DOENÇA. UTILIZOU-SE UM MEIO DE COMUNICAÇÃO CHAMADO DE "TRABALHO RELACIONAL", QUE ENVOLVE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE E RECONHECIMENTO DE SUTILEZAS DO PACIENTE, DE MANEIRA QUE ELE E SEUS FAMILIARES PUDESSEM SE ENVOLVER NO TRATAMENTO. OS RESULTADOS OBTIDOS FORAM: PLANO I - 39 PACIENTES TRATADOS EM AMBULATÓRIO (PRESENÇA OPCIONAL DO FAMILIAR) E SEM SEDAÇÃO; PLANO II - OITO PACIENTES TRATADOS EM AMBULATÓRIO (PRESENÇA DO FAMILIAR EM TODAS AS SESSÕES) E SEM SEDAÇÃO; PLANO III - QUATRO PACIENTES TRATADOS EM DOMICÍLIO E DOIS RECEBERAM SEDAÇÃO. CONCLUIU-SE QUE A PARTICIPAÇÃO DO FAMILIAR/CUIDADOR, BEM COMO O TRABALHO RELACIONAL IMPLICANDO O PACIENTE NO ATENDIMENTO CLÍNICO, CONSTITUI-SE BASE FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO TERAPÊUTICO EM TODOS OS ESTÁGIOS DA DOENÇA.

**FORUM CIENTÍFICO**

**FCI-010 - SAÚDE COLETIVA**

Data: 28/01/2012 Horário: das 16h30 às 16h55

APRESENTADOR / AUTOR: **NAIARA DE PAULA FERREIRA**

CO-AUTOR1: **CLAUDIO RODRIGUES LELES**

CO-AUTOR2: **MARIA DA LUZ ROSÁRIO DE SOUSA**

CO-AUTOR3: **JAIME APARECIDO CURY**

TEMA DO TRABALHO: **AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA SOBRE CARIOLOGIA**

**RESUMO:**

O CONTROLE DA CÁRIE COMO DOENÇA BISSOCIAL E O TRATAMENTO DE SUAS SEQUELAS REQUER A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICAMENTE CAPAZES E SOCIALMENTE ENGAJADOS NA SOLUÇÃO DESSE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA. AVALIOU-SE O CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA (FOP) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) SOBRE CARIOLOGIA AO LONGO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. 274 ESTUDANTES RESPONDEU AO QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO SOBRE CARIOLOGIA (QKC), QUE CONTÉM QUESTÕES DAS ÁREAS BÁSICA, CLÍNICA E DE SAÚDE COLETIVA. OS ESCORES OBTIDOS DOS ACERTOS NAS QUESTÕES FORAM COMPARADOS ENTRE TURMAS DE GRADUAÇÃO E TIPOS DE QUESTÕES (ANOVA PARA MEDIDAS REPETIDAS), E FEITA ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO (K-MEANS CLUSTER PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PERFIS DE CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES) E COMPARAÇÃO COM A TURMA DE GRADUAÇÃO (QUI-QUADRADO PARA TENDÊNCIA). O ESCORE TOTAL MÉDIO (MÁXIMO 45) OBTIDO FOI DE 26,0±4,9, TENDO SIDO OS ESCORES INFLUENCIADOS PELA INTERAÇÃO DO ANO DE GRADUAÇÃO EM CURSO E GRUPOS DE QUESTÕES (P<0,001). OS CONHECIMENTOS CLÍNICO E DE SAÚDE COLETIVA AUMENTAM E SE MANTÊM A PARTIR DO SEGUNDO ANO DO CURSO (P<0,05). NA FORMAÇÃO DOS CLUSTERS FORAM IDENTIFICADOS TRÊS PERFIS DE ESTUDANTES (INGRESSANTE, CLÍNICO E GENERALISTA), CARACTERIZANDO A EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO E A INTEGRAÇÃO DOS CICLOS DE ENSINO (P<0,001), INDICANDO FORMAÇÃO GENERALISTA.

**FORUM CIENTÍFICO**

**FCI-012 - MATERIAIS DENTÁRIOS**

Data: 28/01/2012 Horário: das 17h30 às 17h55

APRESENTADOR / AUTOR: **SILVERIO DE ALMEIDA SOUZA TORRES**

CO-AUTOR1: CLAUDIA SILAMI DE MAGALHAES

CO-AUTOR2: ALLYSON NOGUEIRA MOREIRA

CO-AUTOR3: DANIEL ANDRADA MARIA

CO-AUTOR4: AUDREY CRISTINA BUENO

TEMA DO TRABALHO: **PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE UM COMPOSITO À BASE DE SILORANO.**

RESUMO:

UMA DAS FORMAS DE SE ANALISAR A PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO SE DÁ PELA OBTENÇÃO DOS VALORES DE DUREZA. O OBJETIVO DESTES ESTUDO FOI PESQUISAR A PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO, ATRAVÉS DA MENSURAÇÃO DA MICRODUREZA KNOOP, EM CORPOS DE PROVA CONFECCIONADOS A PARTIR DO COMPÓSITO À BASE DE SILORANO FILTEK P90™/3M-ESPE (FP90). OS TESTES DE MICRODUREZA DUREZA KNOOP (KH) FORAM REALIZADOS CONFECCIONANDO CINCO ENDENTAÇÕES NA BASE DE CADA AMOSTRA, SOB UMA CARGA DE 50G DURANTE UM PERÍODO DE 50 SEGUNDOS. APÓS ANÁLISE DOS DADOS, NÃO FOI VERIFICADA INFLUÊNCIA DAS UNIDADES FOTOATIVADORAS NA KH (P=0,174) PARA AS PROFUNDIDADES ESTUDADAS. O TESTE DE FRIEDMAN MOSTROU EFEITO SIGNIFICATIVO DAS PROFUNDIDADES SOBRE A KH (P=0,007; DMS=7,96) SENDO MAIOR NA PROFUNDIDADE DE 2 MM [41,76(39,98-41,82)], QUANDO COMPARADA ÀS PROFUNDIDADES DE 4MM [33,09(20,11-34,74)] E DE 5MM [20,23(10,22-24,81)]. O PRESENTE ESTUDO CONCLUIU QUE, EMBORA NÃO TENHA HAVIDO INFLUÊNCIA DAS UNIDADES FOTOATIVADORAS UTILIZADAS SOBRE OS VALORES DE KH PARA O COMPÓSITO À BASE DE SILORANO FILTEK P90™/3M-ESPE, ESTES DIMINUÍRAM EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE. OBSERVOU-SE TAMBÉM QUE OS MAIORES VALORES PARA A VARIÁVEL RESPOSTA KH FOI OBTIDO PARA A PROFUNDIDADE DE 2MM, SUGERINDO A UTILIZAÇÃO DE UM INCREMENTO COMPATÍVEL COM ESTA PROFUNDIDADE.

**FORUM CIENTÍFICO**

**FCI-013 - ENDODONTIA**

Data: 28/01/2012 Horário: das 18h às 18h25

APRESENTADOR / AUTOR: **THIAGO GANGEMI BARROS DETOMMASO DOS SANTOS**

CO-AUTOR1: **FREDERICO CANATO MARTINHO**

CO-AUTOR2: **FABIANA GAMA BENEVIDES FRÓES**

CO-AUTOR3: **HELENA ROSA CAMPOS RABANG**

CO-AUTOR4: **BRENDA PAULA FIGUEIREDO DE ALMEIDA GOMES**

TEMA DO TRABALHO: **NESTED PCR: ESTUDO DA DIVERSIDADE DE TREPONEMAS SPP. NAS INFECÇÕES ENDODÔNTICAS PRIMÁRIAS**

**RESUMO:**

ESPÉCIES PERTENCENTES AO GÊNERO TREPONEMA SÃO DE DIFÍCIL CULTIVO, SENDO DETECTADAS NOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DE TÉCNICAS MOLECULARES. O OBJETIVO DO PRESENTE ESTUDO FOI INVESTIGAR ESPÉCIES TREPONEMA DENTICOLA, T. MALTOPHYLUM, T. PECTINOVORUM, T. SOCRANSKII E T. VINCENTII EM INFECÇÕES ENDODÔNTICAS PRIMÁRIAS COM LESÃO PERIAPICAL (IEPL) ATRAVÉS DA TÉCNICA MOLECULAR DE NESTED-PCR, CORRELACIONANDO SUA PRESENÇA COM O DESENVOLVIMENTO DE SINTOMATOLOGIA CLÍNICA DE ORIGEM ENDODÔNTICA. FORAM SELECIONADOS 21 DENTES COM NECROSE PULPAR E LESÃO PERIAPICAL. AMOSTRAS MICROBIOLÓGICAS FORAM COLETADAS DE CANAIS RADICULARES UTILIZANDO CONES DE PAPEL ESTÉREIS. DNA BACTERIANO FOI EXTRAÍDO UTILIZANDO QIAAMP DNA MINI KIT. CINCO PRIMERS ESPÉCIE-ESPECÍFICOS PARA A REGIÃO 16S RDNA FORAM UTILIZADOS. TODAS AS ESPÉCIES INVESTIGADAS FORAM DETECTADAS EM PELO MENOS UM DOS CANAIS RADICULARES ANALISADOS. AS ESPÉCIES MAIS FREQUENTEMENTE DETECTADAS FORAM: T. PECTINOVORUM 28,6% (6/21), T. SOCRANSKII 28,6% (6/21), T. MALTOPHYLUM 28,6% (6/21), T. VINCENTII 19,0% (4/21). ASSOCIAÇÃO POSITIVA FOI ENCONTRADA ENTRE AS ESPÉCIES: T. SOCRANSKII E T. DENTICOLA ( $P < 0,05$ ); TREPONEMAS SPP. E PRESENÇA DE SINTOMATOLOGIA CLÍNICA ( $P < 0,05$ ). CONCLUIU-SE QUE DIFERENTES ESPÉCIES DE TREPONEMAS SPP. ESTÃO PRESENTES EM CANAIS RADICULARES COM INFECÇÕES ENDODÔNTICAS PRIMÁRIAS E PODEM ESTAR RELACIONADAS COM A PRESENÇA DE SINTOMATOLOGIA CLÍNICA DE ORIGEM ENDODÔNTICA. PALAVRAS-CHAVE: TREPONEMA, NECROSE PULPAR, NESTED-PCR, ENDODONTIA



**FORUM CIENTÍFICO**

**FCI-014 - SAÚDE COLETIVA**

Data: 28/01/2012 Horário: das 18h30 às 18h55

APRESENTADOR / AUTOR: **VALDINEIA MARIA TOGNETTI**

CO-AUTOR1: **NAIARA DE PAULA FERREIRA**

CO-AUTOR2: **MARIA DA LUZ ROSÁRIO DE SOUSA**

CO-AUTOR3: **JAIME APARECIDO CURY**

TEMA DO TRABALHO: **CONCEITOS DE CÁRIE DENTÁRIA NA FORMAÇÃO EM ODONTOLOGIA**

**RESUMO:**

A CÁRIE DENTÁRIA, DOENÇA DE CARÁTER MULTIFATORIAL, AINDA É UM DOS PROBLEMAS MAIS PREVALENTES EM SAÚDE BUCAL. OS CONCEITOS SOBRE A DOENÇA INCORPORADOS DURANTE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL INDICAM A CONDUTA ADOTADA PELOS MESMOS NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA. O OBJETIVO DO PRESENTE TRABALHO FOI VERIFICAR A CONCEITUAÇÃO DE CÁRIE DENTÁRIA DOS ESTUDANTES DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA (FOP) DA UNIVERSIDADE DE CAMPINAS (UNICAMP). REALIZOU-SE ESTUDO TRANSVERSAL, COM 274 ESTUDANTES QUE RESPONDERAM À UMA QUESTÃO DISCURSIVA DE CONCEITUAÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA. AS RESPOSTAS FORAM ANALISADAS PELA TÉCNICA DA ANÁLISE DO CONTEÚDO E AS FREQUÊNCIAS FORAM EXPRESSAS EM NÚMEROS ABSOLUTOS E PERCENTUAIS, E TESTADAS PELO TESTE DO QUI-QUADRADO (&#967;<sup>2</sup>), SENDO CONSIDERADO  $P < 0.05$ . AS CATEGORIAS DE RESPOSTA FORAM: CONCEITO BIOLÓGICO (53,60%), CONCEITO MULTIFATORIAL RESTRITIVO (12,10%), CONCEITO MULTIFATORIAL ABRANGENTE (8,07%), CONCEITO DE TRANSMISSIBILIDADE (15,85%) E OUTROS (10,38%) E HOUVE DIFERENÇA ENTRE O ANO DE GRADUAÇÃO CURSADO ( $P < 0,001$ ). OBSERVOU-SE NÃO HAVER CONSENSO NA DEFINIÇÃO DA DOENÇA EMBORA HAJA CARÁTER PREDOMINANTEMENTE BIOLÓGICISTA DOS ESTUDANTES NA CONCEITUAÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA.